

DWRP 3: AKSJOMATYCZNA DEFINICJA PRAWDOPODOBIENSTWA.

PRZESTRZENIE PRODUKTOWE I WARUNKOWE.

Definicja. Przestrzenią probabilistyczną nazywamy trójkę $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, gdzie Ω jest zbiorem zdarzeń elementarnych, \mathcal{F} jest „porządną” rodziną podzbiorów (σ -algebrą), której elementy nazywamy zdarzeniami, a $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ jest funkcją prawdopodobieństwa taką, że

- (i) $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$ dla dowolnego zdarzenia $A \subseteq \Omega$,
- (ii) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$,
- (iii) Dla ciągu parami rozłącznych zdarzeń A_1, A_2, \dots , zachodzi $\mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$.

Definicja. Niech $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, \mathbb{P}_1)$ i $(\Omega_2, \mathcal{F}_2, \mathbb{P}_2)$ będą dwoma przestrzeniami probabilistycznymi. Iloczynem (produktem) tych przestrzeni nazywamy przestrzeń $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, gdzie $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$, \mathcal{F} zawiera wszystkie zbiory typu $A_1 \times A_2$, gdzie $A_1 \in \mathcal{F}_1$ i $A_2 \in \mathcal{F}_2$, oraz dla takiej pary zbiorów mamy

$$\mathbb{P}(A_1 \times A_2) = \mathbb{P}_1(A_1) \cdot \mathbb{P}_2(A_2).$$

W podobny sposób definiujemy iloczyn większej (skończonej lub przeliczalnej) rodziny przestrzeni probabilistycznych.

Przykłady:

Schemat Bernoulliego. Niech $p \in (0, 1)$ a n będzie liczbą naturalną. Przypuśćmy, że powtarzamy n razy eksperyment losowy, w którym prawdopodobieństwo sukcesu wynosi p (a porażki $1 - p$). Jeśli przez τ_k oznaczymy prawdopodobieństwo, że uzyskamy sukces w dokładnie k z n prób, to

$$\tau_k = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} \quad \text{dla } k = 0, 1, \dots, n.$$

Rozkład geometryczny. Przypuśćmy, że powtarzamy eksperyment losowy, w którym prawdopodobieństwo sukcesu wynosi p , dopóty, dopóki nie osiągniemy sukcesu. Jeśli przez σ_k oznaczymy prawdopodobieństwo, że potrzebujemy na to k rund, to

$$\sigma_k = p(1 - p)^{k-1} \quad \text{dla } k = 1, 2, \dots$$

Definicja. Jeśli $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ jest przestrzenią probabilistyczną, a $B \in \mathcal{F}$ jest zdarzeniem, dla którego $\mathbb{P}(B) > 0$, wtedy możemy skonstruować **przestrzeń warunkową** $(B, \mathcal{F}_B, \mathbb{P}_B)$ przyjmując

$$\mathcal{F}_B = \{F \cap B : F \in \mathcal{F}\},$$

a dla każdego $A \in \mathcal{F}$

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Prawdopodobieństwo $\mathbb{P}_B(A)$ zwykle zapisujemy jako $\mathbb{P}(A|B)$ i czytamy jako **prawdopodobieństwo (warunkowe) zdarzenia A pod warunkiem (zajścia) zdarzenia B** .

Uwaga. Jeśli zdarzenia A i B są niezależne, to

$$\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A) \quad \text{i} \quad \mathbb{P}(B|A) = \mathbb{P}(B),$$

zakładając, że $\mathbb{P}(A), \mathbb{P}(B) > 0$, bo inaczej prawdopodobieństwa warunkowe nie są dobrze zdefiniowane.

DODATEK A. ZADANIA NA ĆWICZENIA

Zadanie 1. Pokaż, że dla dowolnego ciągu zdarzeń A_1, A_2, \dots , mamy

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i).$$

Zadanie 2. Pokaż, że dla ciągu zdarzeń A_1, A_2, \dots , gdzie dla każdego $i = 1, 2, \dots$, mamy $\mathbb{P}(A_i^c) \leq 3^{-i}$, zachodzi

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) \geq 1/2.$$

Czy jeśli dla każdego $i = 1, 2, \dots$, mamy $\mathbb{P}(A_i^c) = 3^{-i}$, to wtedy

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = 1/2?$$

Zadanie 3. Rzucamy symetryczną monetą do momentu, do kiedy nie wyrzucimy orła. Niech E oznacza zdarzenie, że wykonamy parzystą liczbę rzutów, a $A_{\geq k}$ zdarzenie, że wykonamy co najmniej k rzutów.

- Wypisz wszystkie elementy przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω .
- Znajdź $\mathbb{P}(E)$, $\mathbb{P}(E|A_{\geq 3})$, i $\mathbb{P}(E|A_{\geq 4})$.
- Czy zdarzenia E i $A_{\geq 4}$ są niezależne?
- Czy zdarzenia E i $A_{\geq 3}$ są niezależne?

Zadanie 4. Rzucamy cztery razy kostką. Niech A będzie zdarzeniem, że dokładnie dwa razy otrzymaliśmy wynik parzysty, a B zdarzeniem, że dokładnie raz wyrzuciliśmy szóstkę. Oblicz $\mathbb{P}(A|B)$ i $\mathbb{P}(B|A)$. Czy zdarzenia A i B są niezależne?

Zadanie 5. W urnie są 3 czerwone, 2 niebieskie i 1 zielona kula. Wybieramy z niej losowe dwie kule, wrzucamy z powrotem do urny i powtarzamy proces od nowa.

- Znajdź prawdopodobieństwo warunkowe, że w pierwszej rundzie wyciągniemy kule o różnych kolorach pod warunkiem, że nie wyciągnęliśmy kuli zielonej.
- Znajdź prawdopodobieństwo, że w pierwszych n rundach k razy wyciągniemy kule o różnych kolorach.
- Znajdź prawdopodobieństwo, że pierwszy raz wyciągniemy kule o różnych kolorach w n rundzie.
- Kontynuujemy proces, dopóki nie wyciągniemy kul o różnych kolorach w dwóch, niekoniecznie po sobie następujących, rundach. Znajdź prawdopodobieństwo, że proces będzie trwał n rund.
- Kontynuujemy proces, dopóki nie wyciągniemy kul o różnych kolorach w dwóch kolejnych rundach. Znajdź prawdopodobieństwo, że proces będzie trwał n rund.

DODATEK B. ZADANIA DOMOWE

Zadanie 1. Niech $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5\}$ i $\mathbb{P}(\{\omega_1\}) = \frac{1}{8}$, $\mathbb{P}(\{\omega_2\}) = \mathbb{P}(\{\omega_3\}) = \mathbb{P}(\{\omega_4\}) = \frac{3}{16}$ oraz $\mathbb{P}(\{\omega_5\}) = \frac{5}{16}$. Niech $A = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$, $B = \{\omega_1, \omega_2, \omega_4\}$ i $C = \{\omega_1, \omega_3, \omega_4\}$. Pokaż, że $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(C)$, ale zdarzenia A, B, C nie są niezależne.

Zadanie 2. W sesji student zdaje dwa egzaminy, z analizy i algebry. Szansa, że student zda egzamin z analizy wynosi 0,8, że zda algebrę 0,7, a że zda oba egzaminy 0,65. Jakie jest prawdopodobieństwo, że student:

- zda analizę, a obleje algebrę?
- zda oba egzaminy?
- zda tylko jeden egzamin?
- nie zda żadnego egzaminu?

Znajdź prawdopodobieństwo warunkowe, że student zda analizę, pod warunkiem, że zda algebrę.

Zadanie 3. Znajdź prawdopodobieństwo, że rzucając monetą 28 razy, dokładnie 13 razy wyrzucimy orła.

Zadanie 4. W urnie znajdują się trzy kule czerwone, dwie niebieskie i jedna zielona. Z urny wybieramy losowo dwie kule. Znajdź prawdopodobieństwo warunkowe zdarzenia, że wybierzemy kule różnych kolorów, pod warunkiem, że wiemy, iż wybraliśmy co najmniej jedną czerwoną kulę.

Zadanie 5. Rzucamy kostką tak długo, dopóki nie wyrzucimy szóstki. Przez $D_{\leq k}$ oznaczmy zdarzenie, że wykonamy co najwyżej k rzutów.

- (a) Znajdź $\mathbb{P}(D_{\leq 3})$.
- (b) Oblicz $\mathbb{P}(D_{\leq 3}|D_{\leq 2})$ i $\mathbb{P}(D_{\leq 2}|D_{\leq 3})$.
- (c) Znajdź prawdopodobieństwo, że w pierwszych dwóch rzutach otrzymaliśmy co najmniej jedną jedynkę, pod warunkiem, że rzucaliśmy co dokładnie trzy razy.